

# โรคไข้เลือดออก



โรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี และมี **ยุงลาย** เป็นพาหะของโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเชื้อไวรัสนี้มี 4 ชนิด ผู้ที่เคยป่วยแล้วก็สามารถติดเชื้อซ้ำได้ถ้าได้รับเชื้อต่างชนิดกัน **หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้น ภายใน 2-3 วัน ควรพบแพทย์**

## การรักษา



ให้ยาลดไข้ ยาลดไข้ที่ควรใช้ คือ "พาราเซตามอล" ห้ามใช้แอสไพริน




ดื่มน้ำให้เพียงพอ ในรายที่ขาดน้ำ ให้ดื่มน้ำเกลือแร่บ่อยๆ



ดูอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยมีอาการ กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น หน้ามืด ในช่วงไข้ลด **ให้รีบนำส่ง รพ.ทันที**

## อาการ



## วงจรการเกิดไข้เลือดออก



โรคไข้เลือดออก ไม่ติดต่อจากคนสู่คน ติดต่อกันได้โดยมี **ยุงลาย** เป็นแมลงนำโรค การติดต่อจึงต้องใช้เวลาในผู้ป่วยและในยุง ระยะที่ผู้ป่วยมีไข้สูงประมาณวันที่ 2-4 จะมีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก ระยะนี้จะเป็นระยะติดต่อจากคนสู่ยุง และระยะเนิ่นจำนวนของเชื้อไวรัสในยุงจะมากพออีกประมาณ 8-10 วัน จึงจะเป็นระยะติดต่อจากยุงสู่คน

# 3 เก็บ 3 โรค

- โรคไข้เลือดออก
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

1 เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่ง เพื่อ

ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



2 เก็บขยะ เก็บขยะเศษภาชนะ

ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์  
ยุงลายได้



ด้วยความปรารถนาดีจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง

อำเภอทับดล้อง จังหวัดนิจิตร

3 เก็บน้ำ เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะ

ที่ปิดฝาไม่ได้ให้ปล่อยน้ำทิ้ง หรือ เปลี่ยนน้ำ  
เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือปล่อยปลาหางนกยูง  
กินลูกน้ำ



# โรคไข้เลือดออก

โรคร้าย ที่มียุงลายเป็นพาหะ



องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง  
อำเภอทับดล้อง จังหวัดนิจิตร